

Météo et phéno

Maximum pré
fermeture

Mildiou

Rot brun et taches
fraîches

Oïdium

Présence sur
grappes

Botrytis

Prophylaxie

Tordeuses

Premières pontes

Point météo et phénologie

Les parcelles les plus en avance sont au stade préfermeture de la grappe. Mais les variations sont importantes avec encore des grains de plomb pour les plus tardives.

Les 2-3 mm d'hier sont les seuls enregistrés depuis plus d'une semaine. Nous avons eu la première semaine complète sans pluie depuis le début de la saison.

Le risque de précipitation concerne ce mardi et mercredi. La fin de semaine devrait retrouver une belle stabilité.

Mildiou

Situation

De nouvelles taches fraîches, situées sur les nouvelles pousses et plutôt sur le haut du feuillage sont observées par les partenaires du réseau et par plusieurs viticulteurs et ce, même en parcelles protégées.

Le mildiou s'affiche cette semaine

sous la forme de rot brun sur les baies à taille de petit pois ou plus. Du rot gris (donc sporulant) est encore visible sur les baies plus petites.



Rot brun 12/07

L'état des grappes ne s'est pas dégradé davantage depuis la semaine dernière. Le bilan qui sera fait par le FREDON et la CAA au moment de la fermeture sera un bon indicateur.

Analyse du risque

Les dernières taches ne sont pas associées à des pluies. Une forte hygrométrie peut assurer seule des repiquages. La croissance de jeunes pousses sensibles aux attaques est

favorisée par les écimage, rognage et effeuillage. Ces pousses doivent être protégées avec soin.

La sensibilité des baies va théoriquement diminuer progressivement jusqu'au début de la véraison. Les contaminations à venir s'exprimeront sous forme de rot brun, localisé sur les grappes.

Oïdium

Situation

L'oïdium fait un bond net depuis le précédent bulletin. Des signalements remontent de plusieurs parcelles sensibles qui avaient subies des attaques importantes en 2015 (Sylvaner, Chardonnay, Auxerrois, Riesling). Ces attaques sont sans aucune mesure avec celles de mildiou.

Il est même possible de noter la présence des 2 bioagresseurs sur la même grappe.



Aile droite de la grappe atteinte de mildiou et aile gauche avec des baies oïdiées 11/07



Oïdium sur baies 11/07

Analyse du risque

Ces attaques remontent à plusieurs jours. Les baies sont sensibles jusqu'à la fermeture de la grappe, bien que la période la plus critique d'encadrement de fleur soit passée. L'effeuillage réalisé surtout vis-à-vis du risque botrytis/vers/drosophiles et pour améliorer la protection contre le mildiou conserve un intérêt réel contre l'oïdium.

Une observation des parcelles sensibles est conseillée.

Botrytis

Prophylaxie

La prophylaxie permet de limiter le risque de pourriture grise. Les mesures classiques passent par :

- la gestion de la vigueur : raisonnement de la fertilisation, enherbement...
- l'aération de la zone des grappes : ébourgeonnage, effeuillage, éclaircissage...
- la limitation des blessures des baies : lutter efficacement contre l'oïdium et les tordeuses et limiter les blessures mécaniques lors de passages tardifs.
- l'effeuillage pneumatique afin de chasser les déchets de floraison.

Analyse du risque

La présence de petites baies avec du mildiou qui ne tombent pas (attaques post nouaison) constitue un risque supplémentaire de départ de botrytis. Ces petites baies peuvent être coincées lors de la fermeture de la grappe et être source de foyer primaire.

Le recours plus généralisé à l'effeuillage cette année est une mesure utile qui permet de supprimer les restes de mildiou précoce (crosses partielles) et d'exposer les grappes aux traitements et à la lumière.

Tordeuses

Situation

Les captures de cochylys se poursuivent voire diminuent déjà sur quelques pièges. Les vols

d'eudémis tardent à s'enclencher. Les captures sont nulles à ce jour ou juste débutantes.

Mais c'est l'activité de ponte qui oriente la suite à donner à cette génération.

Vendredi dernier, aucune ponte n'était notée dans les parcelles surveillées.

Ce lundi, ce sont les premières pontes de cochylys qui sont confirmées (St Pierre, Dambach la Ville, Scherwiller, Beblenheim, Colmar, Pfaffenheim...).



Ponte de cochylys du 11/07

Analyse du risque

L'activité de ponte de cochylys devrait s'intensifier à partir de la seconde partie de semaine avec le retour à un temps doux. Les vols d'eudémis vont suivre...

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.